

# 越南、柬埔寨、泰國 高端甜瓜市場推廣與佈局

農友種苗(股)公司

林進德



# 大綱

- 壹、公司簡介
- 貳、計畫緣起
- 參、實施方法
- 肆、結論




# 壹、公司簡介

- 1968年成立於高雄
- 一代雜交蔬果品種之研發、生產、銷售,主要作物包含瓜類、茄科、十字花科、木瓜等
- 於台灣南部設育種研究農場,國內外設有銷售據點
- 立足台灣,放眼世界



# 全球通路布局




- 總公司
- 主要銷售國家 80
- 海外分公司 9



## 貳、計畫緣起

- 南向國家中,越南、柬埔寨、泰國為中南半島樞紐，經濟成長迅速且三國經貿往來密切
- 選定具差異性之甜瓜切入，帶動其他作物銷售



## 預期目標


1. 加強農友品牌知名度與曝光率
2. 建立高品質甜瓜種子及鮮果之認知
  - 在地化產銷流程
  - 建構行銷通路,防堵低價競爭者進入
- 3.發展高端種子市場,提升整體利潤



# 參、實施方法



# 盤點品種與初步篩選

	<p>品種名：卡蜜拉            類型：哈密瓜類型            特色：口感細脆</p>		<p>品種名：F-8010            類型：白皮綠肉類型            特色：早生、口感細嫩</p>
	<p>品種名：朱芬            類型：網紋橘肉            特色：耐蔓割病</p>		<p>品種名：F-7162            類型：白皮橘肉類型            特色：耐蔓割病、肉質細軟</p>
	<p>品種名：鳳華            類型：網紋橘肉，蜜黃皮型            特色：耐儲運</p>		<p>品種名：F-6990            類型：黃皮橘肉類型            特色：產量較高、口感細脆</p>
	<p>品種名：秋華二號            類型：網紋橘肉，蜜黃皮型            特色：早生、耐白粉病</p>		<p>品種名：月香            類型：黃皮橘肉類型            特色：耐蔓割病、口感細脆</p>
	<p>品種名：F-6244            類型：網紋橘肉            特色：耐蔓割病、汁水多</p>		<p>品種名：F-2798            類型：黃皮白肉類型            特色：口感柔嫩</p>
	<p>品種名：鳳仙            類型：網紋白肉            特色：耐蔓割病、汁水多</p>		<p>品種名：銀輝            類型：薄皮甜瓜型            特色：適應力強、耐蔓割病</p>
	<p>品種名：美華            類型：網紋綠肉            特色：耐蔓割病、網紋粗密</p>		<p>品種名：翠妞            類型：薄皮甜瓜型            特色：適應力強、耐蔓割病</p>



# 1.市場調查與分析

- 與當地公司合作,進行資料蒐集:
  - 1) 種子進口與相關檢疫規定
  - 2) 甜瓜主要產區與季節
- 現地調查:
  - 1) 氣候環境與栽培方式
  - 2) 蔬果供應與食用概況
  - 3) 主要甜瓜類型與價格
  - 4) 當地種子與鮮果產銷通路




# 現地調查:農業環境與栽培情況



# 現地調査:種子店



# 現地調査: 蔬果供應



## 策略

- 產品,定價,通路,宣傳
- 避開紅海市場

## 地點 選定

- 主要產區
- 消費城市

## 活動 規劃

- 進度管理:人,事,時,地,物
- 適時彈性調整



## 2. 試作安排

- 小規模試作:
    - 了解品種表現, 篩選潛力品種
    - 品種評估包括風味, 糖度, 肉質, 貯運性...
  - 大面積試作:
    - 針對初步試作成功之品種, 安排擴大面積栽種.
    - 挑選成功之試作點辦理田間展示準備商業推廣
- \*技術指導之重要性**



# 技術指導 (KNOW-HOW TRANSFER)



# 栽培手冊與品種說明(當地語文)

## KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC DƯA LÊ

### 1. KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC

#### 1. Thời vụ gieo trồng:

Có thể trồng quanh năm. Tuy nhiên nên hạn chế gieo trồng vào mùa mưa bão. Nhiệt độ thích hợp gieo trồng 16-32°C. Chọn mùa có nhiệt độ chênh lệch lớn giữa ngày và đêm để trồng.

#### 2. Ủ hạt, ươm cây:

Ngâm hạt trong thuốc Benlate, Benar (Benomyli) pha nồng độ 1000 (60 phút) để khử trùng hạt mang nấm bệnh. Rửa sạch và nước sạch từ 2 - 3h rồi vớt ra rửa sạch. Nhiệt độ thích hợp để ủ hạt từ 26-30°C. Sau 18 - 24h hạt nảy mầm. Đem hạt gieo. Ươm cây 10-14 ngày, khi cây được 2-3 lá thật tiến hành đem trồng.

#### 3. Mật độ và khoảng cách:

- Để một dây cây: khoảng cách trồng 110x40-50cm. Mật độ 1.700-1.800 cây/1000m<sup>2</sup> (610-660 cây/360m<sup>2</sup>). Lượng hạt cần 95-120gr/1000m<sup>2</sup> (35-45gr/360m<sup>2</sup>).

- Để hai dây cây (trồng giữa lợp): khoảng cách trồng 270x40-45cm. Mật độ từ 820-930 cây/1000m<sup>2</sup> (295-340 cây/360m<sup>2</sup>). Lượng hạt giống cần khoảng 40-50gr/1000m<sup>2</sup> (15-20gr/360m<sup>2</sup>).

#### 4. Tia nhánh, để trái:

- Để 1 dây cây: cây con không bấm ngọn, khi dây dưa dài 30cm tiến hành sửa dây, dùng tre ghim cố định dây. Lật bỏ nhánh chèo từ nách lá thứ 8 trở về gốc. Vì tỉa để trái từ nách lá thứ 10-13, mỗi cây để 1-2 trái, nhánh để trái để lại 1-2 lá rồi bấm ngọn, các nhánh không để trái giữ lại 1 lá rồi bấm ngọn. Cây được 16-18 nách tiến hành bấm ngọn chính.

- Để 2 dây cây: cây con được 3 lá thật tiến hành bấm ngọn. Giữ lại 2 nhánh chèo cân khỏe, đều nhất, các nhánh chèo khác tỉa bỏ. Tỉa bỏ chèo chèo từ nách thứ 5 về gốc. Trái sẽ để trên nhánh chèo mọc từ nhánh con, để trái từ nách 5-8, mỗi nách để tối đa 2 trái, chèo để trái giữ lại 2 lá bấm ngọn. Nhánh không để trái giữ lại 1 lá rồi bấm ngọn. Trên nguyên tắc 1 cây để không quá 3 trái.

5. Bón phân: Lượng bón có thể khác nhau tùy vào độ màu mỡ của đất. Lượng phân bón mang tính tham khảo:

Loại phân	Bón lót	Tưới thúc		Tổng lượng phân (kg/1000m <sup>2</sup> )
		5-10 ngày sau trồng	45-55 ngày sau trồng	
Vôi	50	-	-	50
Phân chuồng	1,000	-	-	1,000
NPK 15-15-15.4	70	-	10	80
Lân	20	-	-	20
DAP	-	5	-	5
KCL	-	-	10	10
KNO3	-	-	5	5

### II. PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH

1. Bọ trĩ (rầy lúa hay bọ lạch) sống tập trung trên đợt non hay dưới nách lá non, chích hút nhựa làm cho đợt non chùn lại, không phát triển.

➤ **Biện pháp phòng trừ:** Confidor, Admire, Oncol, Regent, Kotatsu, Pirato, Marvik, Multamet, Mesural.

2. Rệp dưa (rầy nhớt): chích hút nhựa làm cho cây dưa chùn đợt, lá bị vàng. Ngoài ra rầy còn là môi giới truyền bệnh khảm vàng.

➤ **Biện pháp phòng trừ:** Confidor, Admire, Oncol, Bulldock.

3. Bọ phấn: màu trắng, rất nhỏ, sống tập trung trên đợt non hay mặt dưới của lá non, chích hút nhựa cây làm cho đợt non bị xoắn lại.

➤ **Biện pháp phòng trừ:** Confidor, Admire, Dynames, Abacide (Abamectin 2% pha nồng độ 1000).

4. Ruồi (đốt) đục lá: có thành trùng và ấu trùng đều gây hại cho cây, không hại lá non chỉ tấn công lá bánh tẻ, ăn mô lá làm giảm khả năng quang hợp, cây vàng cằn cỗi, lá rụng sớm, giảm năng suất và chất lượng sản phẩm, vết đục đục còn tạo điều kiện cho nấm, vi khuẩn xâm nhập.

➤ **Biện pháp phòng trừ:** vệ sinh đồng ruộng trước gieo trồng (cả lá rụng), tỉa bỏ lá bị tấn công. Dùng bẫy dính, Soti Protein, Dynames, Abacide (Abamectin 2% pha nồng độ 1000), Trigeral (Cyromazine 8.9% pha nồng độ 1000).

5. Bệnh thán thư trên lá vết bệnh có vòng tròn nhỏ đồng tâm màu nâu sẫm, có những chấm nhỏ li ti màu đen tạo thành các vòng trên đồng tâm, trên cuống lá và thân cũng có những vết màu nâu. Vết bệnh trên trái có màu nâu trên làm vỏ da, bệnh nặng có vết này liên kết thành mảng to gây thối trái.

➤ **Biện pháp phòng trừ:** Diflame M-45, Copper B, Antracol, Minork, Daconil.

6. Bệnh đốm lá, héo thân: trên lá xuất hiện đốm lốm đốm tím màu vàng nhạt hoặc nâu đen rồi lan dần dần. Trên thân xuất hiện đốm bông dầu, rỉ dịch nếu để rồi chuyển thành nâu sẫm, vết bệnh khô có khi nứt dọc, trên vết bệnh có nhiều chấm đen nhỏ. Bệnh thường gặp ở gốc, đốt thân khiến cổ rễ phình ra cây héo mà chết.

➤ **Biện pháp phòng trừ:** Fungafon (Imazali 21.2%) pha nồng độ 2000, Sumiler-D pha nồng độ 2000, Topsin-M, Mithane pha nồng độ 10% tưới gốc.

### II - THU HOẠCH

Cây sau nở bông 30-40 ngày (dưa vỏ trơn), 45-55 ngày (dưa lưới, hamiqua) là có thể thu hoạch. Khi cây tuyến trái có thể lấy chỉ màu làm dấu phân biệt ngày nở bông để phân đoán ngày thu hoạch (nếu là giống dưa khi chín và không chuyển màu) hoặc nhìn vào màu sắc vỏ trái (giống dưa chín chuyển màu). Thu hoạch lúc tấn sáng, khi nhiệt độ còn thấp.

\*Lưu ý: Khi thu hoạch, rửa sạch, rửa sạch, rửa sạch, rửa sạch và phương pháp gieo trồng khác nhau sẽ cho năng suất quả không giống nhau. Vì vậy từ lâu trên đây chỉ mang tính tham khảo.



## CÔNG TY GIỐNG CÂY TRỒNG NÔNG HỮU KNOWN - YOU SEED (VIET NAM) CO., LTD

Website: [www.knownyou.com.vn](http://www.knownyou.com.vn)



### PHỤNG TIÊN

Trọng lượng trái 0.8-1.2kg, độ đường 15-19%, thịt nhiều nước, vị thơm nồng. Thời gian từ nở bông đến thu hoạch 30-35 ngày. Giống thích hợp trồng thả tự do.



### THỦY PHƯƠNG

Trọng lượng trái 1.3-2kg, độ đường 14-16%, sản lượng cao. Thời gian từ nở bông đến thu hoạch 40-45 ngày.



### KIM BÍCH

Trọng lượng trái khoảng 1.5kg. Độ đường khoảng 14-16%. Thời gian từ khi gieo đến khi thu hoạch khoảng 55-60 ngày.



### MẬT HOA

Lưới mịn thưa, đầu trái khỏe. Trọng lượng trái 1.6-2.3kg, độ đường 13-16%, khả năng chống. Thời gian từ nở bông đến thu hoạch 37-45 ngày.



### BÍCH THANH

Trọng lượng trái 1.5-2kg, độ đường 14-16%, khả năng chống. Thời gian từ nở bông đến thu hoạch 60-65 ngày. Trái cây cao cấp trồng trong nhà lưới.



### NH-2798

Trọng lượng trái 1.5-2kg, độ đường 14-17%. Thời gian từ nở bông đến thu hoạch 35-40 ngày.



### BẢO KHUÊ

Trọng lượng trái 2.1-2.7kg, độ đường 14-17%. Thời gian từ nở bông đến thu hoạch 45-55 ngày.



### MỸ HOA

Lưới mịn, ổn định. Khả năng chống. Trọng lượng trái khoảng 1.3-1.8kg, độ đường 16-18%. Thời gian từ nở bông đến thu hoạch 40-45 ngày.



### KIM CÔ NƯỜNG

Trọng lượng trái 1.0-1.8kg, độ đường 15-18%. Vị giòn, chất lượng ổn định. Thời gian từ nở bông đến thu hoạch 30-35 ngày.



### CHU PHẦN

Trọng lượng trái 1.5-2.5kg, độ đường 15-18%. Thời gian từ nở bông đến thu hoạch 40-50 ngày.

**Thêm no đủ - thêm khỏe mạnh - thêm hạnh phúc**

CTY PKD: Xã Long An, H. Long Thành, T. Đồng Nai Tel: 0613 844630 - 547787 Fax: 0613 844750

E-Mail: [gtmonghuan@vnn.vn](mailto:gtmonghuan@vnn.vn)

VPGD Đồng Nai: Xã Long An, H. Long Thành, T. Đồng Nai Tel: 0613 501605 - 7 Fax: 0613 844750

VPGD Gia Lai: 67 Hai Bà Trưng, P. Điện Khánh, TP. Pleiku Gia Lai Tel: 059 3723188 Fax: 059 3723189

VPGD Hà Nội: 606 Toà Nhà CT4 A2 Bắc Linh Đàm, P. Đội Kim, Q. Hoàng Mai, Hà Nội Tel: 04 35400260 Fax: 04 35400259



# 廣告宣傳品

 **KNOWN-YOU SEED**

ក្រុមកម្ពុជា «វាយតែ»



ស្នាក់នៅ: ផ្ទះលេខ ៤៧៨៨ - ផ្លូវជាតិលេខ ៤  
ភ្នំពេញ: watangphary@yahoo.com

 **VAHAY**



### 3. 田間展示會

- 邀請對象:種子與鮮果產業鏈之相關人士,包括 農戶,種子商,鮮果販,超市採購員,政府官員
- **品種發表會**:介紹優良甜瓜品種,帶動話題,撮合農民與鮮果採購商,提升利潤



# 田間展示會-柬埔寨






# 品種發表-越南



## 4.鮮果試吃會

- 針對末端消費者(品嚐)
- 創造需求
  - 1) 消費端之需求
  - 2) 生產端之需求(青果商與農民)
  - 3) 種子之需求



# 鮮果試吃-越南胡志明市



# 鮮果試吃-柬埔寨余邊



# 鮮果試吃-泰國清邁



# 網路媒體行銷-柬埔寨與泰國

cellcard Metfone 0K/s 4G 52% 20:13

ค้นหา

โทรศัทพ์มือถือที่...  
m.facebook.com

012656797  
เลขบัญชีฝากบัญชี  
087372797  
095372797

KNOWN-YOU  
農友種苗股份有限公司  
KNOWN-YOU SEED CO., LTD.

MELON MEL-1675  
Net Wt. 1000.00 G  
Lot No. 77447487-07  
Mtl. Germ. 85%  
Packing Date NOV. 21 2019  
Treated TMTD

Like Comment Share

Sam Ourn and 88 others

ศูนย์จำหน่ายพืชสวนร้อยจันทร์ เพื่อนเกษตรกร  
เผยแพร่โดย สมุทที อะไรก็ไม่รู้ (๒) - 27 มีนาคม -

#เมลอนหวานๆจากฟาร์มมาแล้วจ้า  
ช่วงนี้หลายอย่างอาจจะแพง #แต่เมลอนเราไม่แพงน้า เอาไปเลย  
#เพียงกิโลกรัมละ 80 บาท  
เอาใจคนไม่ยากออกจากบ้าน มีบริการส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยจ้า  
ในตัวเมืองเชียงใหม่  
สายทางดง - กาตฝรั่ง... ดูเพิ่มเติม

เพิ่มยอดการกดถูกใจ ความคิดเห็น และการแชร์  
เมื่อคุณโปรโมทโพสต์นี้ คุณจะแสดงโพสต์กับผู้คนมากขึ้น

961 จำนวนคนที่เข้าถึง 693 จำนวนการมีส่วนร่วม

นาย สันติสุข อุทัยแสง, รุ่ง แทตขุ และคนอื่นๆ อีก 12 คน แชร์ 12 ครั้ง

961 คนที่เข้าถึง

173 ความรู้สึก ความคิดเห็น และการแชร์

134 ถูกใจ	14 ตอบโสด	120 ตอบการแชร์
2 รักเลย	0 ตอบโสด	2 ตอบการแชร์
5 😬 ว่าว	0 ตอบโสด	5 ตอบการแชร์
19 ความคิดเห็น	0 บนโสด	19 บนแชร์
13 การแชร์	12 บนโสด	1 บนแชร์

520 จำนวนการคลิกโพสต์

311 การดูรูปภาพ	0 การคลิกลิงก์	209 การคลิกอื่นๆ
-----------------	----------------	------------------

ความคิดเห็นเชิงลบ

0 ชอนโสด	0 ชอนโสดทั้งหมด
0 รายงานว่าเป็นสแปม	0 เลิกถูกใจเพจ

สถิติที่มีการรายงานอาจจะล่าช้าจากสิ่งที่ปรากฏบนโพสต์

柬埔寨:新品種介紹

泰國:哈密瓜販售(網購活動)



# 網路媒體行銷-越南

Hiệp Nguyễn đã chia sẻ một liên kết.  
Quản trị viên · 25 tháng 4 · 🌐

[https://www.youtube.com/watch?v=\\_J5xBiJ8d1s](https://www.youtube.com/watch?v=_J5xBiJ8d1s)



YOUTUBE.COM

**Kim cô nương: Giống dưa "đẻ ra vàng" | VTC16**  
VTC16 | Dưa Kim cô nương thuộc giống dưa thơm, có khả năng sin...

18 12 bình luận 61 người đã xem

Thích Bình luận

Xem thêm 3 bình luận

Quy Tran 🌐  
Sao lại còn kim cô nương của hãng nào làm có khó ko

Nguyễn Tâm NH  
21 tháng 4 · 🌐

Giống dưa mới cao cấp của công ty Nông Hữu



Trinh Tran  
21 tháng 4 · 🌐  
Bạn ấy lên đồ coi đẹp dữ hen.  
Đề Đặc Mặt Nông Hữu.

越南:當地電視台報導

越南:新品種介紹



## 肆、結論

- 1. 逐漸打開農友品牌知名度(特別是柬埔寨), 提升當地農民整體收益
- 2. 持續追蹤進度
- 3. 外溢效果:
  - 帶動其他作物(例如西瓜, 木瓜, 茄果類等)
  - 期望拓展到鄰近國家(例如寮國)



# 報告完畢，敬請指教

